

НАСИ MASC

МАГНИТНЫЕ ПРИСОСКИ АКУПУНКЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ

(МПАД)

Инструкция для пользователя



Сожмите и прикрепите к телу, иглоукальвание
на дому. Это так просто.

НАСИ Акционерное общество с ограниченной
ответственностью «НАСИ»

Общество международной торговли с ограниченной
ответственностью «НАСИ»



Внимательно прочтите инструкцию перед применением

- 1 **Краткое представление о «НАСИ» МПАД**
- 2 Представление продукции.
- 2 Способ применения
- 3 Противопоказания и меры предосторожности.
- 4 **Новейшие научно-исследовательские достижения «НАСИ»**
- 4 Важное открытие в истории медицины: магнитное поле может активизировать патологические клетки.
- 4 Испытания в Университете медицинских наук им. Бетхуна доказали: МПАД может активизировать фермент SOD
- 5 Иллюстрации крови при повреждении свободными радикалами и после лечения
- 5 Профессор Гу Гуанчжоуского университета медицинских наук им. Сунь Исяня добился большого прорыва в лечении сахарного диабета.
- 6 **Краткое представление о видах терапии МПАД**
- 6 1. Аши терапия точки боли.
- 8 2. Технология увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг · Ядерная энергия жизни
 ◇ Наблюдение эффекта лечения в кислородо-недостаточных клетках
- 8 3. Терапия через сосуд Ду
- 9 4. Терапия через сосуды Жэнь и Ду
- 10 5. Терапия рефлекторного района ног
- 11 **Указание по лечению конкретных болезней с помощью МПАД**
- 11 Лечение воспаления околоплечевой области (периартрит)
- 12 Лечение боли в пояснице
- 12 Лечение болезней шейных позвонков
- 13 Лечение ревматического артрита
- 13 Лечение импотенции и бесплодия.
- 14 Лечение нефрита (нефролитиаза)
- 14 Лечение простатита
- 15 Лечение болезненной менструации и ненормальной менструации
- 15 Лечение грудницы
- 16 Лечение последствия апоплексии (нижних конечностей)
- 17 Лечение гипертонии
- 17 Лечение гиперлипемии (повышенного содержания липидов в крови)
- 18 Лечение бронхита, воспаления легких, астмы
- 18 Лечение зубной боли
- 19 Лечение сахарного диабета
- 19 Лечение гастрита и язвы желудка
- 20 Лечение болезни сердца и венечных артерий
- 20 Лечение головной боли и бессонницы
- 21 **Избранные рецепты от пользователей**
- 23 **Краткое представление изобретателя МПАД, профессора Го Ливэна**
- 24 Добровольное лечение профессора Го Ливэна

КРАТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О МАГНИТНЫХ ПРИСОСКАХ АКУПУНКЦИОННОГО ДЕЙСТВИЯ (МПАД)


Десятки научных испытаний, более тысячи клинических наблюдений и 20 млн. пользователей свидетельствуют о том, что МПАД, продолжая традиции китайской медицины, осуществляют иглотерапию без прокола кожи. Каждый из нас может использовать их для лечения, просто, удобно и эффективно.



Иглоукальвание можно проводить дома, стоит лишь сжать пачку и прикрепить ее к телу. Это так просто.




Рекомендовано Китайской Ассоциацией Иглотерапии.




Представление продукции

МПАД «НАСИ» состоит из сумочки воздушного давления, воздушного канала сумочки, магнитной иглолки, прозрачной магнитной чашки, полярной отметки, трапециевидного магнитного хомута, долговечного магнитного сплава, защитной шейки присоски и т.д. В частности, магнитная иглолка сделана из вечного сплава редкоземельных металлов с поверхностным магнитным полем > 250 мТ. С помощью магнитной чашки магнитные силовые линии проникают в тело человека на 6–9 см, эта глубина равна глубине проникновения традиционной иглолки. Для использования присоски сожмите сумочку и поставьте магнитную иглолку на кожу, разожмите руки, и МПАД укрепитесь на теле человека, при этом не прокалывая кожу. Можно одновременно использовать несколько, даже десятки присосок, так же, как используют сразу несколько иглолок в традиционной китайской медицине.


Испытания в ноль магнитном пространстве еще раз доказали: «НАСИ» МПАД заметно способствует циркуляции сосудов



Нормальная электрокардиограмма у здорового человека



Ненормальная электрокардиограмма до лечения у больного, страдающего болезнью сердца и венечных артерий



После 5 минут применения МПАД электрокардиограмма уже нормальная.

**ПРОСТО ;УДОБНО
БЕЗОПАСНО;ЭФФЕКТИВНО**

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Сначала намажьте прилагаемую специальную мазь в соответствующем количестве. Если на теле большое количество волос, то следует намазать большее количество мази, тем самым прижав волосы к телу. Затем сожмите сумочку большим, указательным и средним пальцами
2. На каждой точке используйте МПАД в течение 15 минут, ка

с тем, чтобы выпустить воздух. Поставьте присоску так, чтобы край магнитной чашки полностью прилегла к коже. Разожмите пальцы и оставьте присоску саму держаться на теле. После использования сожмите сумочку и легонько снимите присоску, при этом, чтобы не поранить кожу, не стоит снимать присоску с силой.

ждый день 1 или 2 раза, протяженность одного курса лечения составляет 10 дней.

3. Перед тем, как использовать МПАД на ногах, рекомендуется помыть ноги в теплой слабосоленой водой.
4. Каждый раз после использования МПАД присоски следует очистить для последующего применения.
5. Для того чтобы стимулировать кровообращение, перед процедурой рекомендуется пить

воду.

- МПАД бывают трех размеров: большие, средние и маленькие. Во время применения следует выбирать размер присоски согласно площади участка кожи: на большой площади большой размер, на маленькой площади маленький. Эффективность у них одинакова. МПАД микроразмера следует использовать на пальцах рук и ног, на носу, ушах, глазах и других местах небольшой площади, а также для детей младшего возраста.

Противопоказания и меры предосторожности

- У некоторых людей (примерно 1 10млн.), как и во время традиционного иглоукалывания, наблюдалось обморочное состояние после применения МПАД. Если во время процедуры у Вас появляются сердцебиение, головокружение, холодный пот или другие симптомы, надо немедленно прекратить процедуру и лечь. Если симптомы достаточно сильны, следует нажать пальцами на вертикальную бороздку верхней губы и пить воду с сахаром в умеренных количествах. Симптомы исчезнут за короткое время.
- В случаях сильной усталости или чувства голода не желательно сразу же использовать МПАД, а лучше провести процедуру только после 30 минут отдыха или через 30 минут после приема пищи.
- Беременные женщины должны использовать МПАД только с согласия врача.
- Больным с электрическим стимулятором сердца применять МПАД не рекомендуется.
- Больные, страдающие гемофилией, тромбопенической пурпурой или другими болезнями, легко вызывающ ими кровотечение, должны осторожно относиться к использованию МПАД.
- Больные с повышенной чувствительностью кожи должны осторожно относиться к использованию МПАД; запрещено применять МПАД на пораненной

или гноящейся коже.

- Большое количество влажных токсинов может вызвать волдыри на коже, поэтому время каждой процедуры не должно превышать 15 минут. Больные с нежной кожей должны умеренно сократить время процедуры во избежание появления волдырей. Однако не стоит слишком бояться волдырей, ведь их появление это результат выделения токсинов, что свидетельствует об эффективности лечения. После обычного дезинфицирования волдыри исчезнут через короткий промежуток времени. Применение нашей продукции совершенно добровольно. Наша компания не несет ответственности за появление волдырей или инфекции во время использования.
- После процедуры цвет кожи может измениться. Это показатель серьезности заболевания, он исчезнет через несколько дней.
- Иголки МПАД не следует держать вблизи от источника тепла. Температура дематизации у магнитного сплава редкоземельных металлов 100С.
- МПАД следует хранить на расстоянии более 10 см от телевизора, часов и других предметов, на которые легко

Чем сильнее боль при использовании МПАД, тем выше эффективность лечения.

Использование МПАД может вызвать сильную боль. Но чем сильнее боль, тем выше эффективность лечения. Боль от иголок МПАД, вызванная заболеванием, это абсолютно разные явления. Врачи китайской медицины считают, что одним из самых эффективных средств для лечения болезни является боль от иглотерапии. В частности, некоторые люди чувствуют сильную боль от применения иголок на ноге, что свидетельствует о хорошей потенциональной эффективности лечения. Например, снятие боли в пояснице получит хорошую эффективность не только через Аши терапию точки боли, но и путем иглоукалывания на ступне и одежде ноги. Этот способ годен и для снятия других видов боли.



Сожмите и прикрепите к телу, иглоукалывание на дому. Это так просто.

Новейшие научно-исследовательские достижения «НАСИ» МПАД

Важное открытие в истории медицины: магнитное поле может активизировать патологические клетки

1. Всего через 15 минут лечения сращенные патологические клетки совсем разъединились и были восстановлены в нормальное состояние.

2 февраля 1999 года профессор Го Ливэнь, используя электронный микроскоп в 20 тыс. раз для наблюдения эффективности лечения МПАД, заметил, что после 15 минутного лечения при помощи МПАД сращенные эритроциты больного полностью разошлись.

2. Доказана теория современной электробиологии и китайской медицины о том, что активация крови может вылечить болезни.

В учебнике высших учебных заведений "Биология" написано, что отрицательные электрические заряды на поверхности клеток отталкиваются друг от друга, а не срастаются. Необходимый человеку кислород главным образом перевозят эритроциты. В случае перегомления или болезни объем электронных зарядов на эритроцитах снижается, и отталкивающая сила между ними тоже уменьшается, эритроциты срастаются или их активность понижается. Одновременно способность переноса кислорода тоже снижается или утрачивается.


Испытания показывают: вертикальное магнитное поле, образуемое присосками с N-полюсом и присосками с S-полюсом на артерии заняв (точках Нэйгуан и Вайгуань), действует на текущую кровь и заряжает клетки, повышает отрицательные электронные заряды на поверхности клеток и их отталкивающую силу. Таким образом сращенные клетки расходятся.

Результат этого испытания еще глубже доказал теорию современной электробиологии и китайской

медицины о том, что активация крови способствует лечению болезней, и тем самым открыла светлое будущее для медицины в 21 веке. Конечно, это открытие ждет дальнейшего исследования и применения.



Наблюдение крови из кончика мизинца через электронный микроскоп в 20 тыс. раз. Эритроциты срастаются.



После применения присосок с N-полюсом и присосок с S-полюсом на артерии запястья в течение 15 минут сращенные эритроциты уже полностью разошлись.





Иллюстрация крови с нормальными эритроцитами

Испытания в Университете Медицинских наук им. Бетхуна доказали: МПАД может активизировать энзим SOD

Международные медицинские круги единодушно считают: свободные гены являются главным фактором старения человека, включающего в себя морщины на коже и старение внутренних органов; а главным способом борьбы против старения является очищение свободных генов с помощью энзима SOD.

Профессор Чжау Даюань Университета Медицинских наук им. Бетхуна опробовал двухполюсный способ МПАД на кролике и жидкости из его организма. Испытания показывали, что активность энзима SOD у кролика повысилась на 28,6%.

Испытания на кроликах свидетельствуют о том, что двухполюсный способ МПАД, воздействуя на точки и жидкость организма, активизирует энзим SOD и повышает у человека способность борьбы против свободных генов. Этого нельзя добиться с помощью лекарств. Поэтому верно то, что специалисты оценивают технологию повышения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг как "ядерную энергию жизни", повышающую у человека природную способность оздоровления.




Структура крови, при повреждении свободными генами и после лечения

Медицинские исследования в Китае и за рубежом показывают, что виновником болезней и старения человека являются свободные гены, которые связаны с более чем 100 болезнями, такими, как повышенное кровяное давление, болезнь сердца и перенос артерий, инфаркт сердечной мышцы, атеросклероз и другие сердечно-сосудистые заболевания. Свободные гены также повреждают нуклеиновые кислоты, в результате чего в генах DNA возникает мутация, что приводит к раку и к ускоренному старению человека.



Кровь здорового человека.




Кровь больного раком.

Уровень SOD сильно снизился и лишился способности устранения свободных генов, надо повысить уровень SOD.



Кровь переутомленного человека. Белые пятна в слезе говорят о повреждении свободными генами.



Кровь после лечения по технологии увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг.

Профессор Гу Гуанчжоуского университета медицинских наук им. Сунь Исяня добился большого прорыва в лечении сахарного диабета

Профессор Гуанчжоуского университета медицинских наук им. Сунь Исяня Гу Сяньфэй по теории сосудов человеческого тела и на основании того, что биоэлектронное магнитное поле активизирует энзим и содействует выделению инсулина, используя двухполюсный способ для проведения испытаний на крысах, добился большого прорыва в лечении сахарного диабета. В результате, если до испытания у болеющих сахарным

диабетом крыс уровень содержания глюкозы в крови натощак составлял 18.50 mmol/L, то после испытания в группе, где применяли МПАД, уровень глюкозы в крови снизился в среднем до 5.88 mmol/L, а в моче глюкозы вообще не было обнаружено, в то время как у остальных крыс уровень глюкозы остался почти на прежнем уровне и составил 18.22 mmol/L. В дальнейшем профессор Гу также добился большого успеха в

регулировании уровня поджелудочной железы (в том числе поджелудочной ткани, кальция в инсулине и гликогена в печени и почках). Он заметил с помощью электронного микроскопа, что после использования МПАД содержание атрофированного инсулина у болеющей сахарным диабетом крысы заметно увеличилось и выделение инсулина тоже заметно повысилось.



Фото в электронный микроскоп: в группе, где не применяли МПАД, поджелудочная ткань все еще остается сжатой, а клетки уменьшенными.




Фото в электронный микроскоп: в группе, где применяли МПАД, поджелудочная ткань увеличилась, и в

Одна магнитная присоска может вылечить сахарный диабет — репортаж из Гонконга

Собственный корреспондент газеты "Гонконгский коммерсант" Ли Юньань сообщает: господин Бао, 68 лет, страдает сахарным диабетом 2 степени уже много лет, многократно проходил разные курсы лечения, но безуспешно. Уровень содержания глюкозы в крови натощак достигал 13.9 mmol/L, а уровень глюкозы в моче ++++. В ноябре 1998 года по рекомендации одного из друзей он купил МПАД НАСИ и стал лечиться сам по инструкции к применению. После четырех 10-дневных курсов лечения уровень глюкозы в моче стал отрицательным (-), а глюкоза в крови снизилась до 7.9 mmol/L. Жажда, учащенное мочеиспускание, усталость и другие симптомы исчезли, а больной стал энергичным. Его родные и друзья называют это чудом.

КРАТКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ВИДАХ ТЕРАПИИ МПАД

МПАД имеет 5 основных видов терапии, каждый из которых очень прост. Овладев этими 5 видами, для повышения эффективности лечения вы можете использовать их одновременно или по отдельности в зависимости от состояния болезни. Например, Аши терапия точки боли с терапией сквозь сосуд Ду; технология увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг и терапия рефлекторного района ног со всеми другими видами терапии.

1. Аши терапия точки боли

Применяйте при появлении боли. Быстрое снятие боли за 15 минут

Аши терапия это терапия той части тела, где ощущается боль. Следует проводить процедуру при появлении боли, при этом очень важно найти правильную точку для игоукалывания, не стоит торопиться. Эта способ терапии способен не только влечивать многие часто встречающиеся болезни (что в традиционном игоукалывании называется терапией эффективных точек), таких, как ревматический артрит шейных позвонков, плеч, поясницы и конечностей, но он также пригоден и для лечения сложных и мало изученных болезней, таких, как моноплегия. Для применения этого способа вы можете последовать приведенным ниже иллюстрированным примерам. Каждая процедура должна длиться 15 минут, 1-2 раза в день, продолжительность одного курса лечения 10 дней. Для некоторых

усмотрению. Для снятия боли, онемения и опухоли на пальцах рук и ног следует прикрепить присоски с N-полюсом и S-полюсом по обеим сторонам. Можно добиться большего терапевтического эффекта, если надавить на присоску с небольшой силой.

Аши терапию можно применять вместе с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр.8).



боль на ступне

ых болезней для достижения эффекта достаточно всего лишь 1-2 раза применения МПАД.

Аши терапия точки боли имеет хорошую эффективность в снятии боли. При этом применяется способ концентрированной расстановки присосок. Например, на шею или поясницу можно поставить 6-9 присосок, перемежая N-полюс с S-полюсом. Заштрихованная часть на рисунке указывает место, где можно расположить присоски по своему




лечение ринита

Надавливайте с помощью мини присосок по линии сверху вниз



зубная боль, включая паралич лица



лечение невралгии седалищного нерва

Примечания:

Заштрихованная часть на рисунке указывает место, где можно расположить присоски по своему усмотрению.

- Синие точки: присоски с N-полюсом
- Красные точки: присоски с S-полюсом

Аши терапия точки боли



Лечение бронхита и астмы.

снятие боли в желчном пузыре



снятие боли в шеи и плечах

снятие боли в пояснице



снятие боли в коленном суставе

Примечания:

Заштрихованная часть на рисунке указывает место, где можно расположить присоски по своему усмотрению.

- Синие точки: присоски с N-полюсом
- Красные точки: присоски с S-полюсом

снятие головной боли



Прикрепите одну присоску с N-полюсом на вершину головы, затем прикрепляйте присоску с S-полюсом поочередно вокруг головы.

2.Технология увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг · Ядерная энергия жизни

Необходимый каждому человеку способ поддержания здоровья. Применяйте процедуру 1-2 раза в день, и через 30 дней вы будете чувствовать себя энергичным и бодрым.

А. Магнитная иглотерапия: поставьте присоски на точках ① ② ③ ④ согласно рисунку (на артериях запястья и щиколотки). Можно расположить присоски по диагонали, т.е. на левой руке и правой ноге, или на правой руке и левой ноге. Можно так же поставить присоски одновременно на обеих сторонах. На каждую точку ставьте присоску на 15 минут, каждый день 1-2 раза. За эти 15 минут сердце по артериям доставляет во все органы тела кровь, активизируемую в магнитном поле.



Б. Упрощенная дыхательная гимнастика: перед процедурой выпейте стакан воды (примерно 250ml), во время процедуры расслабьтесь и д

ышите полной грудью (10-15 раз в минуту).

В. Показания: болезнь сердца и венечных артерий, гипертония, повышенное содержание липидов в крови (гиперлипемия), сахарный диабет, артрит конечностей, охла


ждение конечностей, последствия апopleксии, неврастения, головокружение, бессонница, забывчивость, болезни желудка, нефроз, сексуальные расстройства и т.д.

Наблюдение эффекта лечения в кислородо-недостаточных клетках

В своем исследовании директор научного института «НАСИ» профессор Го Ливэнь открыл, что на поверхности кислородо-недостаточных клеток есть так называемые "колючки". По технологии увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг он поставил МПАД «НАСИ» с N-полюсом и с S-полюсом на обе стороны артерии запястья, тем самым создав вертикальное магнитное поле, действующее на текущую кровь. Спустя 15 минут он взял образец крови и увидел, что "колючки" на поверхности клеток уже исчезли. На следующих рисунках показаны наблюдения под электронным микроскопом с увеличением в 20000 раз.



На поверхности кислорода-недостаточных эритроцитов есть "колючки".



Через 15 минут после начала применения МПАД «НАСИ» на артерии запястья "колючки" исчезли, и эритроциты пришли в нормальное состояние.

3.Терапия сквозь сосуд Ду

Основываясь на движении магнитного поля с N-полюса до S-полюса, расставьте присоски с N-полюсом и присоски с S-полюсом (перемещая) равноудаленно друг от друга вдоль сосуда Ду между точками Дачжуй и Яюй (смотрите на иллюстрацию) с тем, чтобы магнитное поле проходило через весь сосуд от начала до конца. Это и называется терапией сквозь сосуд Ду. Сосуд Ду, называемый одновременно "морем положительных сосудов", находится на осевой линии спины. Терапия сосуда Ду может вылечить болезни и укреплять здоровье. Терапия сосуда Ду, находящегося в центре нервной системы, помогает лечить последствия апopleксии, паралич головного мозга, старческое слабоумие, детский паралич, эпилепсию, синдром Паркинсона, головную боль и другие болезни нервной системы.

Эффективность лечения может повысится в сочетании со следующими видами терапии:

1. Технология увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

1. Терапия точек на голове (смотрите на стр. 7, лечение головной боли путем Аши терапии точки боли).

1. Терапия рефлекторного района ног (смотрите на стр. 10). Поставьте на ноги побольше присосок с тем, чтобы боль ощущалась сильнее, а эффективность лечения была лучше. Этот способ по эффективности лучше традиционного массажа.



Терапия сквозь сосуд Ду

Примечание: вышеуказанные клетки с "колючками" называются в медицине иглоклетками. Благодаря восстановлению этих клеток за короткое время головная боль большого заметно ослабилась. Из этого следует, что после восстановления повысилась возможность этих клеток переносить кислород.

4. Одновременная терапия сосудов Жэнь и Ду



Сосуд Жэнь находится на осевой линии груди и живота, а сосуд Ду находится на осевой линии спины! Расставьте присоски с N-полюсом равноудаленно друг от друга на спину по сосуду Ду, а присоски с S-полюсом на животе по сосуду Жэнь с тем, чтобы создалось вертикальное магнитное поле. Такой способ терапии проывает оба сосуда Жэнь и Ду.

Принцип выбора полюсов магнитного поля: присоски с N-полюсом следует ставить на сторону, которой ближе больные внутренние органы, а присоски с S-полюсом — на другую сторону. Например, во время лечения сахарного диабета и желудка железная и панкреатическая железы находятся позади желудка и ближе к спине, поэтому следует ставить присоски с N-полюсом на спину, присоски с S-полюсом на живот. время лечения болезней желудка следует поставить присоски с S-полюсом на живот (желудок ближе животу), а присоски с S-полюсом на спину.

Терапия при раздельной остановке присосок: в этом случае присоски следует ставить раздел-

но согласно положению органов тела человека. На верхнюю часть тела присоски следует ставить при лечении трахеита, болезни сердца и легких; на середину — для лечения болезней желудка, почек и сахарного диабета; на нижнюю — для лечения цистита, простатита, дисменореи и сексуальной неспособности.

Эффективность лечения может повыситься в сочетании со следующими видами терапии:

1. Технология увеличения притока

кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).
2. Терапия точек на голове (смотрите на стр. 7, лечение головной боли путем Аши терапии точки боли).
3. Терапия рефлекторного района ног (смотрите на стр. 10). Поставьте на ноги побольше присосок с тем, чтобы боль ощущалась сильнее, а эффективность лечения была лучше. Этот способ по эффективности лучше традиционного массажа.




Иллюстрация подъема ноги

5.Терапия МПАД «НАСИ» рефлексорного района ног


Один из больных сахарным диабетом сказал, что во время лечения кроме п остановки присосок на тело он каждый раз ставил еще около 10 присосок на ноги, эффективность лечения была очень хорошая, чувство жажды и боли в ногах совсем исчезло.

В сочетании с применением присосок на теле применение терапии рефлексорного района ног заметно повышает эффективность лечения.

Точки на ногах являются отражением всех других органов человека.

Клиническое наблюдение показывает, что во время лечения гипертонии, болезней сердца, сахарного диабета, моноплегии, артрита и других болезней терапия рефлексорного района ног повышает эффективность лечения. На рефлексорные районы

лимфатических желез, почек, половых органов и т.д., показанные на картинке, можно воздействовать в сочетании со всеми главными рефлексорными районами в целях повышения эффективности лечения.



- ① щитовидная железа
- ② спинной мозг
- ③ желчный пузырь
- ④ надпочечник
- ⑤ точка боли в пояснице
- ⑥ двенадцатиперстная кишка

Примечание: Терапия рефлексорного района рук и ног МПАД «НАСИ» лучше пальцевого массажа, потому что она удобнее, эффективнее, и к тому же экономит силы. Вы можете проводить терапию рефлексорного района ног у себя дома с помощью МПАД «НАСИ» согласно книгам по данной тематике.



Иллюстрация ступни

Указание по лечению конкретных болезней с помощью МПАД

- Без поиска точек для иглоукалывания
- Иллюстрированные инструкции
- Самолечение на дому
- Безопасно и эффективно
- Хороший домашний врач
- Без прокола кожи


Лечение воспаления околоручевой области.

Применение: 1. Прикрепите присоски на точки ① ② ③, как показано на рисунке.
 2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.
 3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).



● присоска с N-полюсом и синим сердечником
 ● присоска с S-полюсом и красным сердечником

варианты
расстановки
присосок на
пояснице



● присоска с N-полюсом и синим сердечником
● присоска с S-полюсом и красным сердечником



Лечение боли в пояснице


Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④, как показано на рисунке, сконцентрируйте внимание на области боли ①. 2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней. 3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

Лечение болезней шейных позвонков

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ②, как показано на рисунке, сконцентрируйте внимание на области боли ①. Ставьте присоски точно на место боли. Сконцентрированная постановка присосок улучшит оздоровительный эффект. 2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней. 3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).



варианты
расстановки
присосок в
области шеи



Лечение ревматического артрита

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④, как показано на рисунке, сконцентрируйте внимание на области боли ②, расставьте присоски с N- и S-полюсами по обе стороны больного места. Большее количество присосок повышает эффективность.

2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.



3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

Лечение импотенции и простермии





Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④ ⑤ ⑥, как показано на рисунке. Если присоска не держится на точке ③, следует придерживать ее рукой. 2. Возьмите в одну руку присоску с N-полюсом, а в другую с S-полюсом, затем приставьте их на 15 минут на обе стороны яичек, и также на 15 минут на обе стороны полового члена.

3. Применять 1 раз в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

4. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).



варианты расстановки присосок в области колена






● присоска с N-полюсом и синим сердечником
● присоска с S-полюсом и красным сердечником

Лечение нефрита (нефролитиаза)

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③, как показано на рисунке.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).




● присоска с N-полюсом и синим сердечником
● присоска с S-полюсом и красным сердечником

Лечение простатита

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④, как показано на рисунке; точка ② находится на расстоянии 4 прижатых к друг другу пальцев ниже пупка (пальцев самого большого); точка ④ находится по середине между анальным отверстием и половыми органами.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).





Лечение болезненной менструации и ненормальной менструации

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④, как показано на рисунке. Точки ① на спине должны находиться точно на уровне точек ② на животе.
2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.
3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

- присоска с N-полюсом и синим сердечником
- присоска с S-полюсом и красным сердечником

варианты расстановки присосок



Лечение грудницы

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③, точки ① находятся на больной области. Можно поставить присоски по обеим сторонам больного места или вокруг него, перемежая N-полюс и S-полюс.
2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.
3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).





Лечение последствия апоплексии (нижних конечностей)

Применение: 1. Больной должен лечь на бок или на живот, сначала расставьте присоски на точки ① с интервалом в 1 или 2 пальца, по осевой линии к больной ноге, а ниже колена линия уходит от осевой линии к внутренней стороне ноги (смотрите рисунок). Если болезнь в тяжелой степени, то следует так же расположить присоски спередине на точки ②, на ногу присоски можно поставить пореже. Точка ③ находится на вершине головы, сначала оставьте присоску с N-полюсом, затем нажимайте присоской с S-полюсом вокруг головы. Если паралич левой нижней конечности, то главным образом стоит акцентировать усилия на правой стороне головы и наоборот, на какую точку следует нажимать 10-30 раз со средней силой. Этот способ противопоказано применять при мозговом кровоизлиянии.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут (можно постепенно увеличивать до 30 минут), продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

- присоска с N-полюсом и синим сердечником
- присоска с S-полюсом и красным сердечником



Лечение гипертонии

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ①②③④⑤⑥. Точки ① находятся в канаве пониженного кровяного давления за ушами. Также можно поставить присоски с N-полюсом и с S-полюсом соответственно внутри уха и позади него.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).



Лечение гиперлипемии (повышенного содержания липидов в крови)



Применение: 1. Поставьте присоски на точки ①②, как показано на рисунке.

2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней. Рекомендуется при этом пить 1.5 литра магнетизированной воды в день.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).



● присоска с N-полюсом и синим сердечником
● присоска с S-полюсом и красным сердечником



● присоска с N-полюсом и синим сердечником
● присоска с S-полюсом и красным сердечником

Лечение бронхита, воспаления легких, астмы

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③, как показано на рисунке, точки ① должны соответствовать точкам ②.

2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).


Лечение зубной боли

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③, как показано на рисунке.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).





- присоска с N-полюсом и синим сердечником
- присоска с S-полюсом и красным сердечником




Лечение гастрита и язвы желудка

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④, как показано на рисунке, точки ① должны соответствовать точкам ②.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

Результат клинического испытания Хэйлунцзянского университета китайской медицины



Лечение сахарного диабета

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④ ⑤, как показано на рисунке, точки ① должны соответствовать точкам ②.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).

Лечение болезни сердца и веречных артерий


Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④ ⑤, как показано на рисунке.

2. Применять 1-2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).




④



⑤


- присоска с N-полюсом и синим сердечником
- присоска с S-полюсом и красным сердечником



⑦



⑧



⑨

Лечение головной боли и бессонницы

Применение: 1. Поставьте присоски на точки ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ как показано на рисунке. Точка ⑨ находится на вершине головы, прикрепите на нее одну присоску с N-полюсом, затем одной присоской с S-полюсом надавливайте вокруг головы, сделайте 3-5 кругов или надавите на каждую точку 10-30 раз, особое внимание уделите точке, где боль ощущается особенно сильно, на нее можно надавить с силой в течение 1-3 минут.

2. Применять 2 раза в день по 15 минут, продолжительность одного курса лечения 10 дней.

3. Рекомендуется применять в сочетании с технологией увеличения притока кислорода в сердечную мышцу и головной мозг (смотрите на стр. 8).



Избранные рецепты от пользователей

Центр консультации специалистов НАСИ получил несколько десятков тысяч писем от пользователей МПАД. Много пользователей в процессе применения обобщили или методы лечения, отличающиеся простотой и практической эффективностью. Мы выбрали некоторые из них, и искренне надеемся, что широкий круг пользователей откроет хорошие и эффективные методы лечения и рекомендует компании НАСИ с тем, чтобы МПАД еще лучше служила людям.

1. Способ быстрого обезболевания:

Воспаление околоручевой области вызывает сильную боль. Для использования двухполюсного способа, сначала нащупайте пальцами точку, где боль ощущается особенно сильно, затем прикрепите на найденное место от 2 до 4 присосок с N-полюсом спереди, и соответствующее количество присосок с S-полюсом сзади. Этот способ имеет хорошую эффективность в обезболевании, он также пригоден для обезболевания в других суставах.

2. Укус комара: Намажьте специальную мазь НАСИ, потом прикрепите присоску на место укуса комара, и зуд сразу же прекратится. А если укус находится на пальце, можно надавить кончиком иглолки.

3. Тонзиллит: Прикрепите присоски с N-полюсом и с S-полюсом соответственно на обе стороны шеи.

4. Детский понос: прикрепите МПАД на пупок, каждый раз на 15-30 минут, эффективность достаточно хорошая.

5. Спазмы и боли в желудке:


① Прикрепите присоску с N-полюсом на точку Чжанцю у основания большого пальца руки; ② Поставьте присоску с N-полюсом над пупком на расстоянии в 5 прижатых к друг другу пальцев. Удобно и просто, применять при появлении боли. Обычно через 15 минут боль прекращается.

6. Мотыльковые пятна: Это болезнь часто встречается на лице у женщин. Загните иглолку одной из присоски, намажьте на мотыльковые пятна мазь против пятен или другую питательную мазь, затем используйте способ движения, повторяйте движение туда и обратно, на каждом месте 3-5 раз. Эффективность хорошая.

7. Головная боль: Прикрепите одну присоску с N-полюсом на точку Байхуй на вершине головы и держите ее неподвижно, затем прикрепляйте присоску с S-полюсом поочередно вокруг головы, в области сильной боли можно надавить с силой 10-30 раз, или на каждую болевую точку надавите присоской в

течение 5-10 минут. Этот способ очень эффективен для лечения головной боли от простуды, нервной головной боли и мигрени. Также пригоден для лечения последствий апopleксии, синдрома Паркинсона, детского паралича, старческого слабоумия, забывчивости, бессонницы, забывчивости и других болезней.

Camolevehne .
Deso > acho n
ga qekt nbho



Избранные рецепты от пользователей

8. Ушиб мягких тканей: прикрепите присоски с N-полюсом и с S-полюсом соответственно на обе стороны ушибленного места.

9. Наросты на теле и уплотнения в груди: прикрепите присоски с N-полюсом и с S-полюсом соответственно по обе стороны нароста. На начальной стадии, можно прикрепить присоску прямо на него.

10. Псориаз и нервный дерматит: намажьте мазь против кожных заболеваний на больное место, затем прикрепите на это место присоски, попеременно N-полюс и S-полюс.

11. Простуда и кашель: прикрепите одну присоску с S-полюсом на выпуклую кость сзади внизу шеи (точка Дачжуй), затем на больное место в области зева прикрепите 2-3 присоски с N-полюсом. Этот способ также годен для лечения бронхита и астмы.

12. Бессонница: я читал в журнале, что японский эксперт иглотерапии, господин Савада, укальвал точку Синцзянь (находится у основания большого пальца ноги сверху с внутренней стороны) и добился хорошей эффективности в лечении бессонницы. Я тоже попробовал использовать МПАД на этой точке Синцзянь в сочетании с расслаблением нервов для лечения бессонницы моей жены.

13. Болезненная менструация: прикрепите присоски с N-полюсом и с S-полюсом соответственно по обе стороны впадины ступни около пятки. Внутренняя сторона пятки является рефлекторным районом матки, а внешняя рефлекторным районом яичника.

14. Тяжесть в груди и в области



Без проколов кожи
Безопасно и эффективно

сердца: Я часто ощущаю тяжесть в груди, сердцебиение, головокружение и другие симптомы. Врачи сказали, что у меня болезнь сердца и венечных артерий. Я читал у друзей книгу об иглотерапии, где написано, что укальвание в точке Нэйгуань обладает заметной эффективностью для лечения болезни сердца и венечных артерий. Я купил МПАД и дома сам укальвал точку Нэйгуань, одновременно с расслаблением нервов и глубокого дыхания. В тот же день тяжесть в груди и в области сердца облегчилась. (Точка Нэйгуань является эффективной точкой для лечения болезни сердца и венечных артерий. Смотрите на стр.20 "Лечение болезни сердца и венечных артерий".)

15. Пыльцевая болезнь: Расположите 3 присоски с N-полюсом равномерно по линии так, чтобы первая была на горле (точку Тяньту), а последняя на середине между двумя грудными сосками (точку Шаньчжун). Затем прикрепите 3 присоски с S-полюсом на соответственные точки на спине. С помощью укальвания точки Саньми и точки Саньинь эффективность еще лучше.

16. Ночное мочеиспускание: каждый день вечером в 21-23 часа прикрепите МПАД на пупок и на

центр ступни на 15 минут, во время процедуры постарайтесь расслабить все тело и глубоко дышать. После недели применения частота мочеиспускания снижается с 5-6 раз за ночь до 1-2 раз.

17. Укачивание от езды на автомобиле и пароходе: меня часто укачивало от езды на автомобиле и пароходе, что принесло много неудобств в жизни. После того, как я испытал МПАД для применения технологии увеличения притока кислорода в сердце и головной мозг, меня уже больше не укачивает. Я еще укальвал виски и точку Иньтан между бровями, а также кончик большого пальца с помощью микроприсоски.

18. Гепатит второго рода: прикрепите присоску на точку Аши в районе печени, затем прикрепите присоски на точки Ганьшу, Даньшу, Пишу на спине, попеременно N-полюс и S-полюс. С помощью этой технологии увеличения притока кислорода в сердце и головной мозг положительная степень превратится в отрицательную.



Хороший домашний
врач

Краткое представление об изобретателе МПАД профессоре Го Ливэне



Изобретатель МПАД «НАСИ» профессор Го Ливэнь

- Председатель правления Корпорации НАСИ
- Председатель правления Акционерного общества с ограниченной ответственностью НАСИ
- Директор Института медицинских наук НАСИ
- Профессор Хэйлунцзянского университета китайской медицины
- Почетный доктор Шанхайского второго университета медицинских наук
- Заместитель председателя совета Ассоциации неправительственных предприятий науки и промышленности
- Представитель правления филиала продукции здравоохранения при Ассоциации медицинской аппаратуры и инструментов
- Председатель правления Комитета специалистов продукции магнитного здравоохранения

Немецкий пациент Миллер с параличом лица выздоровил после 5 сеансов иглотерапии



Немецкий пациент Миллер



Миллер при лечении МПАД.



Выздоровевший Миллер на фестивале празднования весны.

Миллер, 56 лет, живет в Берлине Германии. 25 января 1996 года проходил лечение в основном с помощью лекарств в одной городской больнице после того, как у него случился паралич лица. Однако лечение не принесло никаких результатов. 6 февраля того года он начал лечиться в центре лечения сложных и малопонятных болезней в Хуашаньской больнице в Шанхае и выздоровил всего лишь после 5 сеансов лечения с применением МПАД.



В Государственном спортивном клубе Венгрии профессор Го Ливэнь также использовал МПАД для лечения последствий пузырчатого лишая (больную лечили уже 4 месяца, но результата не было). При встрече с профессором, лицо больной было в поту от нестерпимой боли, а после сеанса иглотерапии боль прошла. Она купила МПАД и написала благодарное письмо.




Господин Хоранди Еван, тренер Государственного спортивного клуба Венгрии, не мог свободно двигаться из-за контузии верхних конечностей. После применения МПАД, он смог поднять руку.

ывов, чтобы написать благодарные слова и оставить свой номер телефона и адрес. "Я уже 14 лет так хорошо не писала," сказала она потом. На другой день, когда ее спросили о болезни, она ответила, что в тот же день вечером даже не принимала успокаивающую ее средство.

Госпожа Морлань из Франции 14 лет назад заболела синдромом Паркинсона из-за того, что ее сын умер в аварии. Каждый день она должна была принимать множество лекарств, чтобы подавить дрожание. Когда она приехала к нам для лечения, ее руки сильно дрожали и не давали ей покоя.

Профессор Го лечил ее с помощью МПАД, и через 15 минут руки больной уже перестали дрожать. "Это просто чудо!" с удивлением воскликнула она и затем просила дать ей книгу отз



第 41261 号

共 2 页

发明专利证书



发明名称: 负压磁疗点穴器

发明人: 郭立文

专利号: ZL 96 1 20798.1

国际专利主分类号: A61N 2/08

专利申请日: 1996 年 11 月 29 日

专利权人: 郭立文

该发明已由本局依照中华人民共和国专利法进行审查,

决定授予专利权。




局长 高卢麟

1998 年 7 月 24 日

МПАД получила патент в Китае.



МПАД получила патент в Японии.



МПАД получила патент в США.



НАСИ

Акционерное общество с
ограниченной
ответственностью «НАСИ»

Общество международной
торговли с ограниченной
ответственностью «НАСИ»